11. osztály Földrajz fakultáció

Földrajzi övezetesség gyakorlás!

Oldd meg az Afrika éghajlataira vonatkozó feladatsort!

a) Azonosítsd az éghajlatokat és a diagramokat! Jellemezd az éghajlatokat a táblázat kiegészítésével!



Éghajlat / Jellemzők	Egyenlítői	Szavanna	Trópusi sivatagi	Mediterrán
A diagram betűjele				
Évszakok száma				
Mikor hull sok csapadék?			–	
Természetes növényzet				
Jellemző talaja (talajai)			–	
Ilyen táj pl.				

b) Írd a diagramok betűjeleit a térképvázlat megfelelő négyszögeibe!

c) Mi szerint változik az (1) számmal jelölt táj éghajlata?

.....

d) Nevezd meg a térképvázlatban számokkal jelölt folyókat!

(2) .....

(3) .....

(4) .....

e) *Húzd alá* a jövevényfolyó nevét!



Igaz-hamis állítás. Miért csapadékosabb kontinens Dél-Amerika, mint Afrika? Írd a megfelelő **I** (igaz) vagy **H** (hamis) betűjelet az állítások elé!

☐ 1. Mert az egyenlítői öv kiterjedése Dél-Amerikában jóval nagyobb, mint Afrikában.

☐ 2. Mert a nyugatias szelek Dél-Amerikában nagyobb területen érvényesülnek, mint Afrikában.

☐ 3. Mert Afrika hatalmas területe fekszik az északi térítői övben, míg Dél-Amerika legészakibb pontjai el sem érik a Ráktérítőt, a déli térítői öv területén pedig elkeskenyedik a kontinens.

☐ 4. Mert Afrikában jóval nagyobb területet foglalnak el a függőleges övezetességű hegyvidékek, mint Dél-Amerikában.

Melyek a mérsékelt övezet közös jellemzői?

a) Évszakok száma: .....

b) Uralkodó szél: .....

c) „Átlátogató, vendégszelek": .....

d) Az évi közepes hőingás változása Ny-ról K felé: .....

.....

e) A csapadékmennyiség változása Ny-ról K felé: .....

.....

Asszociációs feladat. Hasonlítsd össze az éghajlatokat! Írd az állítások elé a megfelelő betűjelet!

A) forró övezeti sivatagi éghajlat
B) mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat
C) mindkettő
D) egyik sem

☐ 1. Kialakulásának oka az óceánoktól való nagy távolság.

☐ 2. Területén erőteljes a fagy okozta aprózódás.

☐ 3. Évszakai nem különülnek el.

☐ 4. A legjelentősebb felszínformáló erő a szél.

☐ 5. Uralkodó szele a passzát szélrendszer leszálló ága.

☐ 6. Tájain a napi hőingás mértéke jelentősen meghaladja az évi közepes hőingását.

☐ 7. Magashegységekkel körülzárt medencékben is kialakulhat.

☐ 8. Előfordulásának példája a Takla-Makán.

☐ 9. Folyóinak nagy része időszakos.

☐ 10. A térítők mentén, a 20° és a 30° szélességi körök között jellemzőek.

☐ 11. Oázisainak jellegzetes termesztett növénye a datolyapálma.

☐ 12. Európában is van ilyen éghajlat.